Albatros real del norte

Artwork by ***Shary Weckwerth***

EL ALBATROS REAL DEL NORTE es uno de los seis grandes albatros del género *Diomedea*, junto con el albatros de Ámsterdam, el real del sur, el de las Antípodas, el de Tristán y el errante. Estas son las más grandes de las 22 especies de albatros que hay en el mundo. Tienen una distribución circumpolar general en el océano Austral y se reproducen en las islas subantárticas. El albatros real del norte tiene una especie "hermana" estrechamente emparentada, el albatros real del sur, y ambas especies son endémicas de Nueva Zelandia y sus islas asociadas.

El albatros real del norte se reproduce en islotes cercanos a las islas Chatham de Nueva Zelandia (Forty-Fours, Gran Hermana y Pequeña Hermana) y en Taiaroa Head, en la punta de la península de Otago de la isla del Sur. La población de las islas Chatham (el 99 % del total) se ha estimado en 6,500 a 7,000 parejas, con una población total estimada de 25,000 a 26,000 ejemplares (que incluye juveniles y aves no reproductoras). Alrededor de 35 parejas se reproducen en Taiaroa Head, la única población de albatros de Nueva Zelandia que se encuentra en tierra firme. El público los puede ver desde un observatorio. Su distribución en el mar es circumpolar, y cabe destacar que incluye las aguas costeras del Pacífico y el Atlántico en el sur de Sudamérica.

Los albatros reales son aves de color blanco y negro, incluso en su plumaje juvenil (a diferencia de los especímenes jóvenes de los otros cuatro grandes albatros, que son en su mayoría de color marrón chocolate). Una característica distintiva (al observarlos de cerca) de ambas especies reales es el borde negro de la mandíbula superior, que contrasta con el pico rosado. Se alimentan principalmente de calamares y peces capturados en la superficie.

El albatros real del norte se considera una especie Amenazada a nivel mundial debido a su acotada área de reproducción y a las tormentas severas de la década de 1980 que arrasaron con el suelo y la vegetación de sus sitios de reproducción en las islas Chatham, lo que perjudicó la calidad del hábitat y causó una baja tasa de reproducción para esta especie de reproducción bienal (cuando tiene éxito reproductivo). Desde estas tormentas, hubo una recuperación parcial. La población de Taiaroa Head, que está fuertemente controlada, está en riesgo por los depredadores introducidos (armiños y gatos salvajes), la miasis en huevos y el estrés por el calor del verano. Estas amenazas se mitigan mediante las trampas, el rociado de nidos con agua de un sistema de rociadores y, a veces, el traslado de huevos a nidos de incubación (para evitar que las moscas les coloquen huevos) para luego devolver los pichones a sus nidos. Los pichones se pesan regularmente, y se suministran alimentos adicionales a los que no aumenten de peso. La alimentación en buques pesqueros puede provocar la muerte en el mar debido al enredo con palangres y la colisión con cables de arrastre. Se solían llevarse pichones de las islas Chatham en el pasado, pero esta "recolección" ahora es ilegal.

Fuentes:

ACAP 2012. Albatros real del norte *Diomedea sanfordi*; https://acap.aq/es/evaluacion-de-especies

BirdLife International 2020. Species factsheet: *Diomedea sanfordi* http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/northern-royal-albatross-diomedea-sanfordi/text

John Cooper, ACAP Information Officer, 12 de febrero de 2020